



CAUCHO

Enfermedad	Síntomas	Tratamiento
<p>Pudrición radicular</p> <p><i>Rosellinia sp.</i></p>	<p>Marchitez del follaje, muerte descendente daño al sistema radicular</p>	<p>Imidazoles, triazoles, Benzimidazoles.</p>
<p>Desecamiento del tallo</p> <p><i>Ustilina sp.</i></p>	<p>Desecamiento de látex. El látex se coagula en el tronco dando una coloración oscura por efecto de oxidación. La corteza dañada presenta una pudrición seca de color café rojizo sin mal olor.</p>	<p>Triazoles Benzimidazoles</p>
<p>Muerte Regresiva o descendente Die Back</p> <p><i>Colletotrichum gloesporoides, C. singullata y Botrydiplodia sp.</i></p>	<p>Muerte descendente de los brotes y ramas iniciando en las extremidades y extendiéndose por toda la planta. Si se observa muerte de las hojas en la parte alta de la planta (primero las hojas se tornan de color café) el tallo infectado presenta color café y puede secarse, no hay pudrición, la enfermedad puede provocar la muerte.</p>	<p>Ditiocarbamatos Benzimidazoles</p>
<p>Enfermedad suramericana de las hojas (South Americana Leaf Blight SALB)</p> <p><i>Microcyclus ulei</i></p>	<p>Se observan manchas de color café verduco en las hojas tiernas. Conforme avanza la enfermedad, estas manchas se unen entre sí cubriendo casi toda la hoja, la cual se marchita ya que sus bordes se retuercen hacia adentro, tomando un color negro hasta que se seca totalmente y cae.</p>	<p>Control genético, Benzimidazoles Triazoles</p>
<p>Pudrición mohosa en el tablero de pica</p> <p><i>Ceratocystis imbricata</i></p>	<p>Parche negro sobre el nivel del corte de pica, que se va extendiendo a todo lo largo del mismo. Luego aparece una especie de hoyo grisáceo o blanquecino en la parte enferma. Se transmite por medio de la cuchilla de pica.</p>	<p>Desinfectar la cuchilla de pica, en una solución de formalina al 1% o cloro al 1%. Cuando la infección es fuerte, se deben hacer de una a dos aplicaciones semanales de fungicidas, por ejemplo Benomyl, Carbendazim, Bay idan, Difeconazol, etc.</p>
<p>Raya negra</p> <p><i>Phytophthora sp.</i></p>	<p>Rayas negras que surgen en el panel de pica arriba del corte y bajan hasta dos pulgadas penetrando en la corteza hacia la madera, atravesando el cambium.</p> <p>Es altamente contagiosa, pues ataca el panel de árboles enfermos con <i>Ceratocystis</i>.</p>	<p>Efectuar aplicaciones periódicas con fungicidas, para tratamientos curativos puede utilizarse fosetyl aluminio, metalaxil+ mancozeb, folpet, captan, captafol.</p>