



PASTO JANEIRO

- **Origen:** El pasto Janeiro es nativo de Sudamérica tropical, Centro América y el Caribe.
- **Zonificación:**

Está adaptado en los lugares bajo de la Cuenca del Río Guayas, en las provincias de: El Oro, Guayas y Los Ríos. También se lo encuentra pero en menor grado en las ganaderías intensivas de la provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas.

- **Características morfológicas:**

Su crecimiento es rastrero estolonífero, que puede alcanzar una altura de hasta 1.20 m. Sus hojas son medianamente anchas pero demasadamente largas. Sus hojas son lanceoladas de 20 a 25 cm de largo y de 8 a 10 mm de ancho. Los tallos como las hojas son lampiñosas. Sus tallos son huecos.

- **Características agronómicas:**

Crece bien en zonas bajas e inundables. En la época lluviosa permanece con una lámina de agua. Tolerancia a suelos medianamente ácidos, como los situados en la Cuenca del Río Guayas, en donde su crecimiento es vigoroso. Es poco resistente a la época seca. Se recupera rápidamente después de la quema. Se recupera rápidamente después de un pastoreo o corte. Resistente a la época seca e inundable no prolongadas. Produce semillas de muy baja viabilidad.

- **Características de calidad:**

De buen valor nutritivo. A los 28 días tiene un contenido de proteína cruda de 15.20 % y su descenso es mínimo con la edad. La digestibilidad de la materia seca va de 52 a 47 %, lo que lo hace apetecido por parte del ganado.

- **Usos:**

Por ser una especie de zonas bajas e inundables, se debe tener en cuenta la carga animal por que puede deteriorar el pastizal. En la época seca, el período de descanso es mas largo de 42 a 45 días sin perjudicar la producción de forraje.

- **Asociación con leguminosas:**

El Janeiro se lo puede asociar con algunas leguminosas como Vigna, Centrosema, Glycine, Macroptilium, etc.