

PASTO SABOYA

- **Origen:**

El pasto Saboya es originario del África, fue introducido al país desde al Brasil por el año de 1950. Donde ha sido evaluado en diferentes prueba de selección.

- **Zonificación:**

Está adaptado a las siete provincia del Litoral ecuatoriano y también se lo encuentra en la Amazonía ecuatoriana.

- **Características morfológicas:**

es una planta de unos 2.50 m de altura, de crecimiento erecto y matoso sus hojas son lanceoladas de 25 a 80 cm de largo y de 8 milímetro de ancho, las cuales se vuelven ásperas con la edad. La panícula o parte floral tiene 30 a 60 cm de largo con varias ramificaciones, donde se encuentran las semillas de 3 a 4 mm de largo. El sistema radicular es fino y bien ramificado. La mayoría de las raíces están concentradas en la capa superior del suelo, lo que ayuda para un rápido desarrollo con ligeras lluvias o riegos.

- **Características agronómicas**

Se adapta bien a todo tipo de suelo, se multiplica por las dos vías, compite con las malezas, produce abundante forraje, se recupera rápidamente después de un pastoreo o corte, resistente a las épocas: seca e inundable no prolongadas.

- **Características de calidad.**

Buen valor nutritivo. A los 27 días se lo puede pastorear teniendo un contenido de proteína de 14 %, 950 kg de materia seca y un 60 % de digestibilidad.

- **Usos:**

Se lo utiliza mas en pastoreo directo con vacas en producción de leche o con vaconas de engorde o toretes de acabado. En la época de invierno, se produce abundante forraje y si la carga animal es baja se puede conservar el excedente de forraje a través de la henificación o el ensilaje, los que conservan su valor nutricional.