



CHIRIMOYA

- **Ubicación:**

El vivero debe ser ubicado cerca de la plantación a realizarse.

- **Diseño:**

Hacer camas altas de 1 m de ancho x 2 m de largo (el largo de la cama dependerá del número de portainjertos a producir, para producir 1000 plantas se necesita 3m de largo de la cama).

- **Preparación del sustrato:**

El sustrato es una mezcla de 2 unidades de tierra negra, 1 de compost y 1 de pomina, sustrato desinfectado mediante usando vapor de agua o con métodos químicos.

- **Tipo de funda y llenado:**

Se utiliza fundas plásticas de tamaño 8x12, con un calibre 3.

- **Siembra:**

Se seleccionan las semillas de frutos sanos para la propagación de portainjertos, y se desinfecta previamente con Vitavax (Carboxin + Captan), se coloca la semilla a una distancia de siembra de 4cmx15cm.

- **Trasplante**

Cuando las plántulas alcanzan una altura de 10 cm a 15 cm se trasplanta a fundas plásticas.

- **Injertación**

Se realiza a los 10 meses del trasplante cuando la planta tiene 40 cm de alto y un diámetro de 1,5 cm. El tipo de injerto recomendado, de acuerdo a experiencias de INIAP, es el de púa terminal.