



CHOCHO

Control de Malezas:

- Manual: Una deshierba y un aporque entre los 45 y 60 días.
- Químico: En pre emergencia se recomienda el uso del herbicida (Imazetapir), sistémico de alto poder residual. Se debe aplicar 2 cc por litro de agua; se ha probado hasta dos días después de la siembra del chocho con buenos resultados.

En post emergencia y en casos extremos (abundante maleza, lluvia persistente, falta de mano de obra y superficies grandes de cultivo) se recomienda la aplicación de Paraquat, en dosis de 2 litros por hectárea; para lo cual se debe emplear pantallas plásticas laterales con el fin de evitar que se quemem las plantas de chocho. La boquilla a usar debe ser tipo abanico, de 30 a 40 cm de cobertura.

Riego:

El chocho es una especie que tolera la falta de agua, pero es importante que exista humedad en la siembra para una buena emergencia de plántulas en la floración y llenado de vainas; por lo que el requerimiento mínimo es de 300 mm de lluvia durante el ciclo de cultivo.

El exceso de precipitación causa enfermedades foliares (antracnosis, ascoquita, cercospora) y pudriciones de raíz; produce acame por incremento de la biomasa y bajos rendimientos.

Cuando se dispone de agua de riego se puede hacer uso de esta, sin causar encharcamientos y en las fases antes mencionadas.