



## SOYA

### Control de malezas

Los productos que pueden ser empleados para combatir las malezas tanto en pre-emergencia como en post-emergencia se detallan en los siguientes cuadros.

### Recomendaciones de herbicidas pre-emergentes.

Producto <sup>1/</sup>	Dosis p.c. /hectárea		Observaciones
	Suelo Ligero	Suelo Pesado	
Alaclor	3.0	3.0 – 4.0	Para malezas gramíneas. Aplicar sobre suelo húmedo hasta 1 día después de la siembra.
Metolaclor	1.2 – 1.5	1.5	
Pendimetalin	2.0	2.0 – 2.5	Para malezas gramíneas. Aplicar sobre suelo húmedo hasta 1 día después de la siembra. Controla caminadora
Oxadiazon	1.5	1.5 – 2.0	Para malezas gramíneas. Aplicar sobre suelo húmedo hasta 1 día después de la siembra.
Metribuzina	0.6	0.6 – 0.8	Para el control de malezas de hoja ancha. Aplicar sobre suelo de textura media y húmeda hasta 1 día después de la siembra.
Linuron	0.7	0.8 – 1.0	Para malezas gramíneas. Aplicar sobre suelo húmedo hasta 1 día después de la siembra.
Pendimetalin + Linuron	2.0 + 0.8	2.5 + 0.8	En aplicaciones en mezcla emplear la dosis menor. Prowl puede reemplazarse por Dual o Ronstar, Afalon puede reemplazarse por Sencor. Aplicar sobre suelo húmedo hasta dos días luego de la siembra.

\* Aplicados en doble dosis y en presiembra incorporado controlan Cyperaceas perennes (coquito).

1/ Se pueden hacer aplicaciones en mezcla para aumentar espectro de control.



## SOYA

### Recomendaciones de herbicidas post-emergentes.

Producto <sup>1/</sup> Ingrediente Activo	Dosis p.c. /hectárea		Observaciones
	Suelos Ligero	Suelos Pesado	
Clethodin	0.80	1.00	Para malezas gramíneas de 2 – 4 hojas. Puede aplicarse en cualquier época de desarrollo del cultivo. Dosis variable según tamaño de malezas.
Haloxifop	0.75	1.25	
Propaquizafop	0.60	0.70	
Acifluorfen	0.80	1.00	Para el combate de malezas de hoja ancha de 2 - 4 hojas en activo crecimiento y cultivo de dos y tres hojas trifoliadas. De contacto
Fomesafen	0.80	1.00	
Imazethapyr	1.00	1.00	Sobre cultivo con primer trifolio. Sistémico, no mezclar con graminicidas.
Propaquizafop + Acifluorfen	0.65 + 0.80	0.65 + 0.80	Para el combate simultáneo de malezas de hoja angosta y ancha. Agil puede reemplazarse por Centurion y Verdict. Blazer puede reemplazarse por Flex

1/ Para aplicaciones en mezclas, bajar dosis entre 10-15%; aunque de preferencia hacer separadamente; primero para hoja ancha y 5 - 7 días después para hoja angosta. Herbicidas para hoja ancha no aplicar sobre cultivo en stress por agua.