



## COCHINILLA

Nombre común: Cochinilla o piojos harinosos

Nombre científico: *Dysmicoccus* sp

**Descripción:** una vez eclosionado los huevos, las ninfas permanecen en las cápsulas por un tiempo corto y luego se movilizan por las plantas, las cochinillas constituyen un insecto plaga de importancia para el cultivo de banano, pues su presencia en la fruta ocasiona el rechazo de la misma en los mercados de destino; de otro lado también, pueden actuar indirectamente como vector del virus del estriado del banano (BSV).

**Daños:** por su gran actividad de sucesión en los tejidos y por la abundante producción de exudados azucarados que favorecen la atracción de hormigas y de otros insectos, además de facilitar el desarrollo de los hongos que producen la fumagina, provocando el rechazo de la fruta en la planta empacadora en el lugar donde se encuentra las cochinillas o se realiza un maduración normal.



Foto: Daños por cochinilla



Foto: Daños por cochinilla



## COCHINILLA

### Tipos de control

- **Químico:** en la empacadora se aplica agua más cloro y un insecticida vegetal de contacto “Cochibiol” el ingrediente activo es Oleatos Vegetales.
- **Cultural:** buenas labores en campo como deschante (eliminación de tejido viejo) buen control de malezas que luego se ven re lejada en la planta empacadora. Se utiliza una manguera a presión que se debe ser dirigida al racimo desde la parte superior hasta la parte inferior especialmente en los pezones de la fruta.



Foto: Control químico de cochinilla