



PICUDO NEGRO

Nombre común: Picudo negro

Nombre científico: *Cosmopolites sordidus*

Descripción: de adulto es un gorgojo de color negro, de unos 13 mm, y cabeza con la prolongación del rostro característico de la especie. En este estado no es dañino. La hembra pone entre 10 y 50 huevos aislados en orificios, que escarban en los rizomas adultos la larva emergen aproximadamente a los 8 días.



Foto: Daños del Picudo Negro

Daños: después que la larva ha emergido devora tejidos, abre una galería hacia el interior del bulbo. Pronto alcanza una longitud de 12 a 16 mm, de color blanco amarillento, con la cabeza parda. Nunca sale al exterior. En este estado dura entre dos y seis meses, luego se transforma en ninfa y después de 5 ó 7 días, en adulto. Cuando hay presente gran cantidad de larvas, se nota debilitamiento general de la planta y producción de racimo pequeño y mal formado y, aún más, por debilitamiento de la estructura del bulbo y del pseudotallo la planta se cae.



Foto: Daños de Picudo Negro

Tipos de control

- **Químico:** en nuestro país ha declinado su incidencia con la aplicación de productos de doble propósito (nematicidas - insecticidas) en dosis variables.
- **Biológico:** trampas confeccionadas con trozos de pseudotallo, con feromonas (Cosmolure),