



PODAS

Tipos de Poda

En el cultivo de la mora se aplican cuatro prácticas de poda, la de formación, fructificación y de renovación o rejuvenecimiento y la selectiva. Zamorano et. al. (2007).

Poda de formación

El objetivo de la poda de formación es la eliminación del tallo de la planta madre, en el momento en que los chupones o tallos principales hayan emergido esto ocurre generalmente a los 30 días de su trasplante también se recomienda eliminar las hojas y ramas bajas, así como la eliminación de flores anticipadas (hay que dejar 4 meses sin fruto). Silva, C (2002).

Para la formación de la nueva planta se seleccionan 6 a 9 ramas, las mismas que presentaran una buena sanidad y vigor pero que preferiblemente broten de diferentes puntos. A estas se les llaman ramas primarias Martínez A. (2007).

Cuando estas ramas primarias han alcanzado una longitud de 2 m se despuntan entre 1,70 a 1.80 m, procurando hacer el corte en la parte que muestre material leñoso, de lo contrario el eje continuara con su crecimiento. Martínez A. (2007).



PODAS

Estos cortes provocan la brotación de ramas laterales, que se convertirán en ramas secundarias productivas, a la vez que es necesario el cortar todos los brotes que salgan de las ramas primarias y que estén bajo los 30 cm del suelo. Martínez A. (2007).

Poda de producción y mantenimiento

Consiste en cortar las ramas secundarias vegetativas que han alcanzado un desarrollo de 60 a 80 cm, se podan a los 50 a 60 cm de igual forma que las primarias para inducir la brotación de ramas terciarias. Esta poda también ayuda a la eliminación del material que ya ha producido eliminar el material enfermo y seco. Martínez A. et. al. (2007).

La frecuencia de la realización de la poda es variable, pero generalmente se debe realizar después de la cosecha.

Poda selectiva

Se realizará el corte a dos yemas de su base, las ramas secundarias y terciarias productivas, que han cumplido su ciclo de producción (aproximadamente cada dos meses) Martínez.A. (2007).

Poda de renovación

Es un sistema de poda que se practica generalmente cuando las ramas ya han cumplido su ciclo de vida útil generalmente entre los 3 años de edad realizando cortes a nivel de la base de la planta para obtener brotes primarios vigorosos Otra razón para realizar esta poda es cuando las plantas han sido atacadas por plagas y enfermedades, granizadas por sequía, vientos fuertes y heladas, lo que provoca que las plantas presenten una marchitez completa. Delgado. F. (2012) y Martínez. A. (2007).