




## BETILLA

<b>Nombre común:</b>	<b>BETILLA</b>
<b>Sinónimos:</b>	
<b>Nombre científico:</b>	<i>Ipomoea spp</i>
<b>Familia botánica:</b>	Convolvulaceae
<b>Ciclo de vida (anual/perenne):</b>	Anual
<b>Descripción:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raíz: Pivotante</li> <li>• Tallo: Rastrero, trepador, voluble, color morado.</li> <li>• Hojas: Alternas, trilobuladas con peciolo visible.</li> <li>• Inflorescencia: Corimbo de color rosa-violeta</li> <li>• Frutos: Capsula trilocular</li> </ul>
<b>Propagación:</b>	Por semillas
<b>Importancia agrícola (efecto en el cultivo):</b>	Esencialmente zonas de arrozceras de secano de Babahoyo, Puebloviejo, Montalvo, Baba, Ventanas
<b>Manejo:</b>	<p><b>Cultural:</b> Buena preparación de suelos, adecuada distancia y densidad de siembra, manejo óptimo del riego y la fertilización, mantener los muros limpios y completar con deshierbas manuales.</p> <p><b>Químico:</b></p> <p>PRE-EMERGENTE Oxadiazón 2,0-2,5 lt/ha; Oxifluorfen 0,8-1,0 lt/ha</p> <p>POST-EMERGENTE 2,4-D amina 0.5-0,7 lt/ha; Propanil 3,5-4,0 lt/ha; Metsulfuron metil 12-15 g/ha.</p>
<b>Referencia bibliográfica:</b>	Lorenzi, H.
<b>Para mayor información:</b>	<a href="mailto:luis.penaherrera@iniap.gob.ec">luis.penaherrera@iniap.gob.ec</a>



**Etapa vegetativa**



**Etapa de floración**