

Manejo de Enfermedades

AGUACATE

Cercoporiosis

Nombre Científico: *Cercospora perseae*

Fuentes de diseminación

Se diseminan por restos de cosecha, por el viento hasta grandes distancias

Cuando se presenta?

- Temperatura altas.
- Humedad relativa alta

Síntomas

Aparece en los frutos y hojas como puntos pequeños, castaños y angulares, que posteriormente se unen para formar manchas irregulares on bordes rojizos bien definidos. Las lesiones en el fruto frecuentemente son el punto de desarrollo del hongo que causa la antracnosis.

Cuando la enfermedad es severa, el hongo destruye y puede hacer que se desprenda todo el follaje de las plantas.



Control

Se comienza eliminando ramas enfermas y con aplicaciones de oxícloruro de cobre en dosis de 100 g/100 L de agua o mancozeb a razón de 250 g/100 L de agua o clorotalonil 180 gramos por 100 litros de agua, antes de iniciarse la floración, se repite el tratamiento dependiendo de la incidencia, en cuajamiento y desarrollo de frutos.






Para más información:

02 2 553 302
info@iniap.gob.ec
www.iniap.gob.ec

Plataformas:

eva.iniap.gob.ec
tecnologia.iniap.gob.ec

Síguenos en nuestras redes:

-  Agroinvestigación Iniap
-  agroinvestigacionecuador
-  @INIAPECUADOR