



## Papa

<b>Nombre común:</b>	<b>Nematodo del quiste</b>
<b>Agente causal:</b>	<i>Globodera pallida</i>
<b>Condiciones para el desarrollo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monocultivo.</li> <li>• Variedades susceptibles.</li> <li>• Plantas hospederas como tomate o especies silvestres de solanáceas.</li> </ul>
<b>Formas de diseminación:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semilla infestada</li> <li>• Suelo</li> <li>• Agua de riego</li> <li>• Herramientas contaminadas</li> </ul>
<b>Síntomas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crecimiento restardado de las plantas en uno o varios puntos en el campo.</li> <li>• Reducción del crecimiento de las raíces.</li> <li>• Las plantas pierden su color natural, se ven pequeñas y se marchitan fácilmente.</li> <li>• Tubérculos pequeños en relacion a los provenientes de plantas sanas.</li> <li>• Reduce el rendimiento.</li> </ul>
<b>Manejo Integrado:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotación de cultivos cada 2 ó 3 años con cultivos no huéspedes como zanahoria amarilla, cebada, cebolla de bulbo, chocho.</li> <li>• Escoger campos libres de nematodos.</li> <li>• Uso de variedades resistentes como INIAP-Gabriela o superchola.</li> <li>• Usos de semilla de calidad.</li> </ul>

**Daños:**

