



## OREJA DE RATÓN

<b>Nombre común:</b>	<b>OREJA DE RATÓN</b>
<b>Sinónimos:</b>	
<b>Nombre científico:</b>	<i>Heteranthera reniformis</i>
<b>Familia botánica:</b>	Pontederiaceae
<b>Ciclo de vida (anual/perenne):</b>	Perenne
<b>Descripción:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raíz: Fibrosa y adventicias en los nudos de los estolones que están en contacto con el suelo</li> <li>• Tallo: rastroero, muy ramificado, forma gran cantidad de estolones</li> <li>• Hojas: Pequeñas de tono oscuro brillante</li> <li>• Inflorescencia: Solitario axilar</li> <li>• Frutos: Cápsula</li> </ul>
<b>Propagación:</b>	Por semillas y partes vegetativas
<b>Importancia agrícola (efecto en el cultivo):</b>	Es una especie que presenta lento crecimiento inicial, y, posteriormente cubre el suelo reduciendo la capacidad de macollamiento del cultivo.
<b>Manejo:</b>	<p><b>Cultural:</b></p> <p>Buena preparación de suelos, adecuada distancia y densidad de siembra, manejo óptimo del riego y la fertilización, mantener los muros limpios y completar con deshierbas manuales.</p> <p><b>Químico:</b></p> <p>POST-EMERGENTE</p> <p>2,4-D amina 0,5-0,7 lt/ha; Metsulfuron metil 12-15 g/ha; Bispiribac sodium 0,35 lt/ha; MCPA 0,5-0,7 lt/ha.</p>
<b>Referencia bibliográfica:</b>	Lorenzi, H.
<b>Para mayor información:</b>	<a href="mailto:luis.penaherrera@iniap.gob.ec">luis.penaherrera@iniap.gob.ec</a>



**Etapa vegetativa**



**Etapa de floración**