

Manejo de Enfermedades

AGUACATE

Roña del fruto

Nombre Científico: *Sphaceloma perseae* Yenk

Fuentes de diseminación

Se diseminan por las hojarascas que se encuentran en las ramas secas del árbol afectado.

Cuando se presenta?

- Temperatura de 22 a 26 grados centígrados
- Humedad relativa alta, de 90 - 100 0%.

Síntomas

Produce en el fruto manchas ovaladas de color café oscuro formando un agrietamiento dando la apariencia de piel de cocodrilo, estas grietas favorece la entrada de otras enfermedades.



Control

Se debe podar ramas internas, sombreadas e improductivas para facilitar la ventilación e ingreso de los rayos solares; eliminar ramas enfermas.

Con aplicaciones de oxiclورو de cobre en dosis de 100 g/100 L de agua o mancozeb a razón de 500 a 700 g/100 L de agua antes de iniciarse la floración, se repite el tratamiento dependiendo de la incidencia, en cuajamiento y desarrollo de frutos.






Para más información:

02 2 553 302
info@iniap.gob.ec
www.iniap.gob.ec

Plataformas:

eva.iniap.gob.ec
tecnologia.iniap.gob.ec

Síguenos en nuestras redes:

-  Agroinvestigación Iniap
-  agroinvestigacionecuador
-  @INIAPECUADOR

Dependiendo de la incidencia de la enfermedad se pueden hacer tres aplicaciones, la primera cuando empieza abrir los botones florales, la segunda cuando termina la floración y la tercera tres o cuatro semanas después.

