



Papa

Establecimiento del cultivo

Selección del lote

La selección cuidadosa del terreno es importante para el éxito del cultivo de papa. Se debe tomar en cuenta diversos criterios, como la presencia de plagas y enfermedades, presencia de distintos tamaños de agregados de suelo y que tengan una capa arable por arriba de los 30 cm, ricos en materia orgánica y nutriente, de tipo negro-andino y de textura arcillosa.

De preferencia seleccionar lotes nuevos o que hayan descansado por lo menos 3 años.


Es importante:

- Evitar zonas propensas a heladas, elija lotes con algún grado de pendiente, debido a que éstos son menos afectados por las heladas.
- No usar terrenos en zonas de anegamiento o con exceso de humedad en el suelo.

Trampeo

El Trampeo consiste en atraer y dar refugio a los gusanos adultos durante el día. Se recomiendan colocar a los 30 días antes de la siembra hasta la emergencia del cultivo, las mismas que se deben colocar 100 trampas/ha (ubicadas a 10 m entre cada una).

En cada una de las trampas se deben colocar de 2 a 3 ramas frescas rociadas con insecticida, utilizar uno de los siguientes: acefato 2 g/l ó profenofos 2.5 cc/l, triflumuron, 1.5 cc/l o diflubenzuron 1.5 cc/l; cubrirlas con cartón/costal de 40 x 40 cm, las trampas se deben renovar cada 15 a 20 días.



Además de aplicaciones foliares a las hojas bajas de las plantas con alguno de los insecticidas recomendados anteriormente a los 40, 60 y 80 días después de la siembra. Adicionalmente se recomienda sembrar dos a tres surcos de papa en los bordes de la nueva sementera al menos un mes antes de la siembra del cultivo principal, luego de lo cual se deben realizar aspersiones foliares cada 15 días hasta la emergencia completa del cultivo con acefato (2 g/l) o profenofos (2.5 cc/l).