



PAJA DE TRIGO

| | |
|---|--|
| Nombre común: | PAJA DE TRIGO |
| Sinónimos: | Falsa caminadora |
| Nombre científico: | <i>Ischaemum rugosum</i> |
| Familia botánica: | Poaceae |
| Ciclo de vida (anual/perenne): | Anual |
| Descripción: | <ul style="list-style-type: none"> • Raíz: fibrosa y adventicias en nudos basales • Tallo: decumbente, ramificado y pubescente en los nudos y estos de color morado-violeta en la base. • Hojas: Pubescentes en el haz y envés en la base de las hojas con lígula. • Inflorescencia: Panícula • Frutos: Cariópside con arista |
| Propagación: | Por semillas |
| Importancia agrícola (efecto en el cultivo): | Esta especie infesta campos arroceros de secano como Babahoyo, Vinces y Montalvo. |
| Manejo: | <p>Cultural: Buena preparación de suelos, adecuada distancia y densidad de siembra, manejo óptimo del riego y la fertilización, mantener los muros limpios y completar con deshierbas manuales.</p> <p>Químico: PRE-EMERGENTE Pendimetalin 2,5-3,0 lt/ha; Oxadiazón 2,0-2,5 lt/ha; Clomazone 1,0-1,2 lt/ha; Oxifluorfen 0,8-1,0 lt/ha; Butaclor 4,0-5,0 lt/ha; Bentio-carbo 2,5-3,0 lt/ha.</p> <p>POST-EMERGENTE Fenoxaprop ethyl 0,85-1,25 lt/ha; Profoxidim 0,6-0,7 lt/ha.</p> |
| Referencia bibliográfica: | Lorenzi, H. |
| Para mayor información: | luis.penaherrera@iniap.gob.ec |



Etapla vegetativa



Etapla de floración