

Manejo de Enfermedades

AGUACATE

Verticilosis

Nombre Científico: *Verticillium albo-atrum*

Fuentes de diseminación

El hongo se propaga por medio de las semillas infectadas, tubérculos y esquejes vegetativos, púas y yemas, así como a través del viento, el agua superficial del terreno y por el suelo.

Cuando se presenta?

- Temperatura altas entre 22° y 28 °C
- Humedad relativa alta.

Síntomas

Penetra por la raíz e invade el sistema vascular impidiendo el paso de agua y nutrientes desde las raíces hacia las hojas, es una marchitez repentina que puede afectar algunas ramas o todo el árbol, las hojas se toman de color café permaneciendo adheridas a las ramas por algunos meses.

Las hojas de las ramas afectadas, toman una coloración café y permanecen adheridas al árbol por algún tiempo y luego caen, mientras que los frutos, se mantienen en el árbol. Posteriormente, los frutos caen y se presenta la muerte descendente de algunas rama.



Para más información:

02 2 553 302
info@iniap.gob.ec
www.iniap.gob.ec

Plataformas:

eva.iniap.gob.ec
tecnologia.iniap.gob.ec

Síguenos en nuestras redes:

- ▶ Agroinvestigación Iniap
- ▶ agroinvestigacionecuador
- ▶ @INIAPECUADOR



Control

No plantar arboles en suelos que han sido cultivados con especies susceptibles como tomate, pepino, papas.

También se recomienda podar las ramas enfermas inmediatamente que aparece el síntoma.