



INIAP - Victoria

Origen

Proviene del cruzamiento entre: INIAP-Gabriela x INIAP-Fripapa

Zona recomendada:

zona centro (Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua)

Características morfológicas

- Plantas de crecimiento erecto, tallos de color verde con pocas manchas y alas rectas.
- Hojas disectadas con 3 pares de folíolos laterales, y un par de inter-hojuelas carecen de inter-hojuelas entre peciolulos.
- Flores moderadas de color lila pálido. Corola muy rotada.
- Tubérculos con un período de reposo de 30 a 40 días. Los tubérculos son ovalados, con ojos superficiales. El color de la piel es rojo-morado-claro. El color de la pulpa es amarillo sin color secundario.

Características agronómicas

- **Días a la floración:** 73-94
- **Días a la cosecha:** 130-150 días
- **Hábito de crecimiento:** Erecto.
- **Vigor de la planta:** Vigorosa
- **Cobertura de la planta:** Completa
- **Tallos por planta:** 3
- **Resistencia al tizón tardío:** Moderada
- **N° de tubérculos /planta:** 30
- **Rendimiento (t/ha):** 40
- **Tamaño del tubérculo:**
 - Guesa (%):** 50
 - Mediana (%):** 40
 - Fina (%):** 10



Usos

- INIAP-Victoria es apta para consumo en fresco en forma de papa cocinada con cáscara, sopas, puré y tortillas. Procesamiento en forma de papas fritas, tipo hojuelas y tipo bastón