



## INIAP - Yana Shungo

### Origen

INIAP-Yana Shungo proviene de autofecundación de la variedad nativa Chaucha HSO 213 (Azuay).

### Zona recomendada:

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo (altitudes de 3000 a 3300 m).

### Características morfológicas

- Plantas de crecimiento semi-erecto, tallos pigmentados con alas rectas.
- Hojas son verde oscuro con 4 pares de folíolos laterales y 2 pares de inter-hojuelas entre folíolos.
- Flores abundantes de color blanco.
- Los tubérculos son de forma oblonga, con ojos profundos. El color de la piel es marrón-intenso y el color predominante de la pulpa es morado y el color secundario es crema. Los tubérculos presentan un período de reposo de 20 días.

### Características agronómicas

- **Días a la floración:** 55-75
- **Días a la cosecha:** 120-150
- **Hábito de crecimiento:** Semi - erecto
- **Resistencia a la lanchar:** Moderada
- **Vigor de la planta:** Vigorosa
- **Cobertura de la planta:** Completa
- **Altura de la planta:** 0.90-1.20m
- **N° de tubérculos /planta:** 12- 20
- **Tipo de brotación:** Múltiple
- **Rendimiento (t/ha):** 7- 29.4
- **Dormancia:** 20-25 días



### Usos

- La variedad INIAP-Yana Shungo es apta para consumo en fresco (papa cocinada, puré, papas al vapor) Además, se puede utilizar procesada como papas fritas tipo hojuelas.